

# Día Mundial de la Psoriasis 2016

Encuesta Impacto Psoriasis y Comorbilidades Asociadas

Madrid, 24 de octubre



Con la colaboración de:

abbvie



1- La psoriasis afecta de forma grave o muy grave la calidad de vida del 22% de los pacientes que la padecen. De éstos, el 14'55% están sin tratamiento

EFECTO GRAVE Y MUY GRAVE (puntuación superior a 11 en DLQI)		
Tratamiento	Porcentaje según tratamiento	Nº pacientes según tratamiento
Tópicos	51,27%	141
Sin tratamiento	14,55%	40
Biológicos	18,55%	51
Sistémicos	10,18%	28
Fototerapia	5,45%	15

2- De los pacientes con una actividad modera-severa, un 17% está sin tratamiento, un 51% en tratamiento tópico y un 4% en fototerapia

DE LAS PERSONAS CON ACTIVIDAD MODERADA-SEVERA	
Tratamiento	Peso de cada tratamiento
Tópicos	51,20%
Sin tratamiento	17,49%
Biológicos	15,94%
Sistémicos	11,57%
Fototerapia	3,81%

### 3- El 85% de los participantes en la encuesta tiene alguna enfermedad asociada y la mayor parte de ellas han aparecido después del diagnóstico de la psoriasis

SEGUIMIENTO DE COMORBILIDADES		
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de Depresión?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	37,70%	46
No	6,56%	8
Sí	55,74%	68
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de APs?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	43,88%	165
No	0,53%	2
Sí	55,59%	209
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de Ansiedad?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	30,06%	95
No	7,59%	24
Sí	62,34%	197
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de Cáncer?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	28,57%	4
No	71,43%	10

<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de Colitis?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	40%	6
No	60%	9
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de Crohn?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	7,69%	1
No	84,62%	11
Sí	7,69%	1
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de Diabetes?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	38,46%	25
No	4,62%	3
Sí	56,92%	37
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de Diagnóstico renal?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	28,57%	4
No	21,43%	3
Sí	50,00%	7
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de E. Hepática?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	32,26%	10
Sí	67,74%	21

<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de Hipertensión?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	32,07%	59
No	8,70%	16
Sí	59,24%	109
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de Osteoporosis?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	34,62%	9
No	3,85%	1
Sí	61,54%	16
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de Prob. Cardiovasculares?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	38,33%	23
No	5,00%	3
Sí	56,67%	34
<b>¿Diagnóstico de PSO antes del de sobrepeso?</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Pacientes</b>
Mismo tiempo	42,90%	157
No	11,20%	41
Sí	45,90%	168

#### 4- Las comorbilidades más prevalentes: sobrepeso, artritis psoriásica y ansiedad

<b>COMORBILIDADES</b>			
	<b>Peso de cada comorbilidad</b>	<b>Media DLQI</b>	<b>Efecto</b>
<b>Ansiedad</b>	16'74%	9'76	<b>Moderado</b>
<b>Artritis Psoriásica</b>	19'86%	6'53	<b>Moderado</b>
<b>Depresión</b>	6'36%	11'44	<b>Grave</b>
<b>Diabetes</b>	3'44%	6'69	<b>Moderado</b>
<b>Enfermedad Hepática</b>	1'64%	9'06	<b>Moderado</b>
<b>Hipertensión</b>	9'75%	6'27	<b>Moderado</b>
<b>Problemas cardiovasculares</b>	3'23%	6'43	<b>Moderado</b>
<b>Sobrepeso</b>	19'33%	7'59	<b>Moderado</b>
<b>Ninguna de estas</b>	15'41%	5'55	<b>Leve</b>
<b>Otros</b>	4'24%		